

SIMVASTATINA
Compuesto Activo:
Liporeductor.
Tabletas 20mg y 40mg

COMPOSICION:

Cada tableta contiene:

Simvastatina -----20 mg -----40 mg
Excipientes c.s.p.-----1 tableta-----1 tableta

INDICACIONES:

Coadyuvante de la dieta para la reducción del colesterol total elevado. LDL-colesterol, apolipoproteína B y los triglicéridos en pacientes con hipercolesterolemia primaria, hipercolesterolemia familiar heterocigoto o hiperlipidemia mixta. Reducir el riesgo de muerte y prevenir ataques cardíacos en pacientes con enfermedades cardíacas y colesterol alto. Para disminuir la aparición de accidentes cerebrovasculares o crisis de isquemia cerebral transitorias.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Se recomienda el diseño de una dieta para a disminución del colesterol.
Debe seguirse a lo largo del tratamiento.

Dosis Inicial: 10 mg al día (dosis única administrada Por la noche.)

En caso necesario hacer ajustes con intervalos no menores de 4 semanas.
Dosis máxima 80 mg al día.

En casos hipercolesterolemia familiar homocigótica.

Dosis Inicial: 40 mg (dosis única administrada por la noche) y ciertos pacientes 80 mg al día (2 dosis al día de 20mg y 40mg administrados por la noche).

Enfermedades Coronarias:

Dosis Inicial: 20 mg al día (dosis única administrada por la noche).

PRESENTACION:

SIMVASTATINA 20 MG: Caja conteniendo 30 tabletas.

SIMVASTATINA 40 MG: Caja conteniendo 30 tabletas.